



Wesleynd 82  
on the way  
Bert Daaffer

## Beplantingsplan

In elke bloembak adviseer ik tenminste de groenblijvende *Trachelospermum jasminoides* - sterjasmijn of Toscaanse Jasmijn, alsdan niet aangevuld met *Mahonia japonica* 'Bealei' – mahoniestruik, welke toegepast kan worden waar de omgeving/locatie of de bewoners om vragen. Echter voor een mooie evenwichtige uitstraling dient minimaal 33% van het aantal toe te passen bloembakken met deze twee heesters aangevuld te worden met vaste planten. Als opmerking geef ik mee, dat de mahonie ca. 150 cm hoog in de 'volle grond' kan worden, zal deze dat niet wordt in een bloembak. Zie de vergelijking met bomen en struiken als Bonsai in een bloembak, door zijn beperkte ruimte kunnen struiken en of bomen niet tot hun volle habitat komen. Zij worden beperkt in voeding, water, zuurstof en bodemleven in vergelijking tot beplanting welke in de volle grond dat wel zouden kunnen. Ook is de mahoniestruik een sterke laagblijvende struik, welke van nature erg langzaam groeit en onderhoudsarm.

Voorgestelde bloembak combinatie kunnen zijn;

### **Bloembak 1 - (100% groenblijvend)**

*Trachelospermum jasminoides*  
*Mahonia japonica* 'Bealei'  
*Lavandula angustifolia* 'Hidcote'  
*Liriope muscari* i.c.m. *Scilla siberica* en *Tulipa sylvestris*

### **Bloembak 2**

*Trachelospermum jasminoides*  
*Geranium* 'Rozanne' i.c.m. *Scilla siberica* en *Tulipa sylvestris*  
*Echinacea purpurea* 'Magnus'

### **Bloembak 3**

*Trachelospermum jasminoides*  
*Lavandula angustifolia* 'Hidcote'  
*Liriope muscari* i.c.m. *Scilla siberica* en *Tulipa sylvestris*

### **Bloembak 4**

*Trachelospermum jasminoides*  
*Alchemilla mollis*  
*Geranium* 'Rozanne' i.c.m. *Fritillaria meleagris* en *Tulipa sylvestris*

### **Bloembak 5**

*Trachelospermum jasminoides*  
*Phlomis russeliana*  
*Aster dumosus* 'Professor Anton Kippenberg' of *Aster novae-angliae* 'Purple Dome'  
*Liriope muscari* i.c.m. *Scilla siberica* en *Tulipa sylvestris*

## Toelichting

De groenblijvende *Trachelospermum jasminoides* - sterjasmijn of Toscaanse Jasmijn is een uitbundig bloeiende klimmende jasmijn met heerlijk geurende, witte bloemen welke niet alleen mooi zijn, maar ook een voedselbron zijn met hun enkelvoudige bloemen voor insecten. De Toscaanse Jasmijn heeft donkergroen, glanzend blad wat aan de plant blijft in de winter. De Jasmijn is een uitstekende groenblijvende klimmer. Deze kan zowel in de halfschaduw als in de volle zon staan. Een zeer lange bloeiperiode; **mei, juni, juli, augustus en september**. Snoeien doen we eventueel in **oktober**.

De bloembak wordt aangevuld met een solitair heester in de vorm van de *Mahonia japonica* 'Bealei' – mahoniestruik een heester waarvan de grote bladeren erg op hulst lijken.

De bloeitijd valt in **februari tot maart** en de bloemen zijn lichtgeel van kleur.

De bloemen geuren naar lelietjes-van-dalen. Na de bloei verschijnen in de vroege zomer prachtige donkerblauwe bessen, welke een bron van voeding zijn voor vogels, in het bijzonder merels.

Als jonge plant is deze mahonie goed te combineren met verschillende vaste planten. De mahonie kan zowel in de zon, halfschaduw als in de schaduw staan.

Ook deze solitair heester is groenblijvend.

Als onder beplanting raad ik aan de *Geranium* 'Rozanne' – ooievaarsbek aan, welke de langst bloeiende geranium is! Zonder twijfel de populairste en beste blauwe geranium. Rozanne bloeit rijk en onafgebroken, met relatief grote blauwe bloemen, van **mei, juni, juli, augustus, september tot eind oktober**. Groeit snel en breeduit. Wordt ook toegepast wordt als bodembedekker.

Geschikt voor veel standplaatsen zowel in zon als schaduw. In de winter verliest geranium wel zij blad, om in het voorjaar weer opnieuw uit te lopen. In het najaar verkleurt het blad vaak naar rood-oranje.

Of wat te denken van de vaste plant en/of half heester, *Lavandula angustifolia* 'Hidcote' - lavendel die bloeit van eind **juni, juli tot eind augustus** met de donkerste blauwpaarse bloemkleur van alle lavendelsoorten. Deze lavendel blijft vrij laag en geurt heerlijk en is daardoor nog altijd één van de beste lavendel soorten. Lavendelplanten staan graag in de volle zon voor een uitbundige bloei, de lavendelplant verdraagt droogte en daarom mede zeer geschikt om als kuipplant dus in betonnen bakken te staan. De gesnoeide bloeiaren die u na de tweede snoeibeurt overhoudt kan binnen gedroogd heerlijk geuren.

*Liriope muscari* - leliegras is een vaste plant die bloeit **augustus, september, oktober** met op blauwe druifjes lijkende bloemen die uit het grasachtige blad groeien. Het is in zachte winters een wintergroene plant die goed als bodembedekker of randplant kan en het prima naar zijn zin heeft in de schaduw. Een must is het aanvullen met stinze bloembollen zoals de *Tulipa sylvestris* – bostulp, de *Scilla siberica* – sterhyacint en de *Fritillaria meleagris* – kievietseitje welke in het voorjaar **februari, maart, april, mei** de dijk nog aantrekkelijker maken, niet in de laatste plaats voor nectar voor insecten, maar ook voor de bewoners en voorbijgangers. De toegepaste beplanting heeft niet alleen een hoge attractieve waarde, maar bloeit ook vrijwel heel het jaar door.

Andere vaste planten als aanvulling kunnen zijn;

*Rudbeckia* - zonnehoed

*Alchemilla* - vrouwenmantel

*Anemone* diverse soorten - herfstanemoon

*Aster* – diversen herfst asters (*Aster dumosus* 'Professor Anton Kippenberg', *Aster ageratoides* 'Starshine', *Aster novae-angliae* 'Purple Dome')

*Phlomis russeliana*

*Nepeta* - kattenkruid